

Premaligne oralne lezije prethode do 70% oralnih canceru, kao što su dugotrajne crvene ili bele mrlje u ustima.

Ovaj vodič obuhvata najčešća mesta oralnog canceru: jezik, unutrašnju stranu obara i pod usne duplje.

### —GLAVNI ČINIOCI RIZIKA—

#### Duvan



#### Alkohol

Sva tri oblika alkohola (pivo, vino i žestoka pića) povezana su sa oralnim cancerom, a pivo i žestoka pića nose veći rizik.




#### bezdimni




Oralni cancer spada u 10 najčešćih canceru, ali velikim delom može se sprečiti manjim izlaganjem činocima rizika

### —OSTALI ČINIOCI RIZIKA—

#### HPV



#### UV izlaganje suncu




#### Sredinski, infektivni i ostali činoci

- Loša oralna higijena
- Hronična candidiasa
- Herpes virus infekcije
- Imunosupresivna stanja (HIV...)

### —ZBRINJAVANE PACIJENTA—

#### PRE LEČENJA CANCERA

##### Pripremiti pacijente pre lečenja canceru



- 1 KORAK Eliminisati infektivno žarište u ustima
- 2 KORAK Sprovesti neinvazivno lečenje
- 3 KORAK Fluorisati zubnom kašikom
- 4 KORAK Preporučiti po potrebi maxilofacijalnu protezu

#### TOKOM LEČENJA CANCERA



##### Smanjiti nuspojave radioterapije

- Koristiti lokalne antiseptike, anestetički gel i nealkoholne alkalne vodice u slučaju post-radioterapijskog mucositisa.
- Sprečiti caries preporučivanjem pranja zuba dvaput dnevno mekom četkicom i pastom sa sadržajem fluora između 2.800ppm i 5.000ppm i/ili primeniti fluornu zubnu kašiku.
- Preporučiti žvakaču gumu bez šećera i zamene za pljuvačku kod xerostomije.



#### POSLE LEČENJA CANCERA

##### Pratiti proces ozdravljenja i moguće vraćanje oralnog canceru

- Provera i pregled najmanje dvaput godišnje.
- Primjeniti antibiotsku terapiju u slučaju traumatskih stomatoloških procedura posle radioterapije.
- Primjeniti netraumtisku protetiku za rehabilitaciju u okviru 6 do 12 meseci.

# Oralni skrining

Stomatolozima pripada mesto u skriningu prvih znakova oralnog cancera kod pacijenata sa velikim rizikom. Stepen preživljavanja može se povećati ranim otkrivanjem i blagovremenim upućivanjem umultidisciplinarne kliničke centre

