

Pourquoi c'est important

Les infections sexuellement transmissibles (IST) restent une préoccupation majeure pour la santé publique dans le monde, en particulier chez les adolescents et les jeunes adultes. Le sexe oral est une pratique courante qui peut transmettre diverses IST pouvant **se manifester dans la bouche**.

Les équipes dentaires sont bien placées pour détecter les signes bucco-dentaires des IST lors des examens de routine, donner des conseils en matière de prévention et de sensibilisation des patients, soutenir l'orientation en temps opportun vers des diagnostics et des traitements, ainsi qu'aborder la santé sexuelle de manière professionnelle, respectueuse et sans jugement.

La détection précoce par les professionnels dentaires peut prévenir les complications et réduire la transmission.



Principales IST impliquant la cavité buccale

Chlamydia trachomatis et Neisseria gonorrhoeae

- Peut infecter l'oropharynx après le sexe oral
- Souvent asymptomatique, d'où l'importance du dépistage
- Les infections gonococciques orales peuvent se manifester par une pharyngite douloureuse et une adénopathie cervicale

Les infections non traitées peuvent entraîner des complications graves telles que l'infertilité.

Les dentistes jouent un rôle important dans l'identification de ces signes lors des examens bucco-dentaires de routine afin de faciliter le diagnostic et le traitement en temps opportun.

Syphilis

- Transmise par rapport sexuel oral, vaginal ou anal, de la mère à l'enfant pendant la grossesse ou par transfusion sanguine

Stades cliniques :

- **Syphilis primaire** : chancre buccal (langue, lèvres, gencives, palais)
- **Syphilis secondaire** : rougeur, fièvre, adénopathie
- **Syphilis latente** : aucun symptôme
- **Syphilis tertiaire** : lésions cardiovasculaires et neurologiques

Les lésions buccales sont fréquentes avec la syphilis primaire, apparaissant souvent sur la langue, le palais, les gencives ou les lèvres et souvent détectées par les dentistes.

Hépatite (A, B, C, D, E)

- Transmise par le sang, les rapports sexuels ou les aliments et l'eau contaminés

Signes bucco-dentaires possibles :

- Jaunisse
- Saignements bucco-dentaires
- Pétéchies et ecchymoses

Les dentistes peuvent observer ces signes pendant les examens bucco-dentaires et orienter les patients vers une évaluation médicale plus approfondie.

Prévention :

La vaccination contre l'hépatite B est fortement recommandée

Virus de l'immunodéficience humaine (VIH)

- Présent dans le sang et les fluides corporels, y compris la salive
- La transmission orale est rare, en raison de facteurs inhibiteurs dans la salive

Manifestations bucco-dentaires courantes :

- Candidose buccale (qui peut être détectée lors des examens dentaires de routine)
- Érythème gingival linéaire
- Gingivite ou parodontite nécrosante
- Leucoplasie chevelue buccale – sarcome de Kaposi

La reconnaissance rapide et l'orientation vers un traitement antirétroviral sont essentielles.

Virus herpès simplex (HSV-1 et HSV-2)

- Transmis par contact muqueux direct lors du sexe oral
- Infection primaire pouvant provoquer une gingivostomatite herpétique aiguë

Les infections non traitées peuvent entraîner des complications graves telles que l'infertilité.

Les dentistes peuvent fournir un diagnostic précoce et des conseils sur la prévention de la propagation de l'herpès.

Prévention et soins :

- Éviter tout contact oral pendant les poussées symptomatiques
- Le traitement antiviral réduit les symptômes, mais ne prévient pas la transmission

Papillomavirus humain (PVH)

- Transmis par contact muqueux
- Certains types sont associés au **cancer de l'oropharynx**


Les lésions buccales comprennent :

- Verrues buccales
- Papillomes squameux
- Condylomes acuminés

Les dentistes peuvent détecter les lésions buccales liées au PVH lors des examens de routine en insistant sur leur rôle préventif.

Prevention:

- La vaccination contre le PVH réduit considérablement les taux d'infection et le risque de cancer



Prévention et responsabilités professionnelles

Prévention primaire

- Rapports sexuels protégés (préservatifs, digues dentaires)
- Vaccination (PVH, hépatite B)
- Dépistage dans les populations à haut risque

Prévention secondaire

- Dépistage précoce et traitement des IST
- Collaboration entre les professionnels dentaires et médicaux
- Antécédents sexuels à l'aide des 5 P : partenaires, pratiques, protection, prévention de la grossesse, IST passées

Considérations éthiques

Les mesures standard de contrôle des infections sont suffisantes dans la pratique dentaire. Les précautions excessives doivent être évitées, car elles peuvent créer de la peur ou de la stigmatisation. Les patients atteints d'IST ne doivent jamais faire l'objet de discrimination.

La gestion efficace des IST nécessite une approche intégrée dans toutes les disciplines de la santé. Les dentistes et les équipes dentaires contribuent de façon essentielle à la prévention, à la détection précoce et au contrôle des IST.



Lire le rapport complet
**Maladies sexuellement
transmissibles et cavité
buccale**